Памятка для персонала ДОУ, ОУ
по противоэпидемическим профилактическим мероприятиям
при неблагополучной ситуации по ОРВИ и гриппу

(Разработана в соответствие с Постановлением Главного государственного санитарного врача по ХМАО - Югре №1 от 11.08.2023 "Об иммунизации населения против гриппа при поготовке к эпидемиологическому сезону острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 2023-2024 года", Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", раздел XXXIII)

1. Согласно п.2649 СанПиН 3.3686-21, острая респираторная инфекция (ОРИ) представляет собой остропротекающую инфекцию респираторного тракта, проявляющаяся катаральным воспалением верхних дыхательных путей и протекающая с лихорадкой, насморком, чиханием, кашлем, болью в горле, нарушением общего состояния разной степени выраженности.
   Под ОРИ понимаются следующие нозологические формы: острый назофарингит, острый фарингит, острый ларингит, острый трахеит, грипп, острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная.
   Учет всех нозологических форм ОРИ должен учитываться при мониторинге причин отсутствия учащихся и воспитанников в образовательных организациях для принятия решения о приостановлении образовательного и очного учебного процесса, а также при предоставлении сведений о ежедневной (еженедельной заболеваемости ОРИ, гриппом).
2. В случае отсутствия по причине гриппа и ОРИ 20% и более детей, приостанавливается учебный и воспитательный процесс приказом руководителя образовательной организации, в соответствии с критериями, определенными СанПиН 3.3686-21.
3. Копии приказов о приостановлении учебного и воспитательного процесса направляются в территориальные отделы Управления Роспотребнадзор по ХМАО – Югре в г.Сургуте в течение 2-х часов с момента принятия решения.
4. При регистрации в образовательной организации очагов ОРВИ, гриппа, внебольничных пневмоний, коронавирусной инфекции проводится комплекс санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с нормативными документами, а также по отдельным предписаниям ТО У Роспотребнадзор:

4.1. ограничение или запрещение проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий, деятельности бассейнов;

4.2. отмена кабинетной системы обучения (каждый класс/группа/отряд занимается в отдельном кабинете/группе);

4.3. введение масочного режима для персонала со сменой масок каждые 3 часа работы. Персонал с признаками заболевания гриппом и ОРИ не допускается к работе с детьми;

4.4. создание надлежащих условий для соблюдения детьми и работниками правил личной гигиены:
наличие жидкого мыла, кожных антисептиков, одноразовых полотенец;

4.5. проведение ежедневного фильтра с занесением результатов термометрии, осмотра в лист наблюдения по каждому классу/группе/отряду с целью недопущения в организованный коллектив детей с признаками инфекционных заболеваний. При выявлении детей с видимыми признаками ОРИ, повышенной температуре тела, дети направляются в медицинский кабинет.

4.6. проведение текущей влажной уборки 2 раза в день (на пищеблоке, в столовой, в спальных
помещениях, кабинетах/классах, групповых, кружковых, местах общего пользования, бассейнах,
санузлах) с применением растворов дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов с последующим проветриванием помещений;

4.7. столы, клеенки обеденных столов, пластмассовые скатерти после каждого приема пищи протирать ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе с помощью чистой прокипяченной ветоши в соответствии с инструкцией к дез. средству.

4.8. При регистрации 5 и более случаев ОРИ в группе:

4.8.1 проводить дезинфекцию столовой посуды и столовых приборов после каждого приема

пищи с использованием дезинфекционных средств, эффективных в отношении вирусов; для обеззараживания столовой посуды в дезинфицирующем растворе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, выделяется емкость с крышкой с четкими надписями с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности;

4.8.2 после дезинфекции посуду промыть моющим средством и ополоснуть водой. Просушить посуду в вертикальном положении, не вытирая её полотенцем. Остатки пищи обеззараживают с помощью разрешенных для этих целей дезинфицирующих средств.

4.8.3 каждые 2 часа способом протирания обеззараживают подоконники, двери, дверные ручки, спинки кроватей, прикроватные тумбочки, водопроводные краны, кнопки, клавиши и других устройств смывных бачков.

4.8.4 ковры 2-х кратно прочистить щеткой, смоченной в дез. средстве. На период карантина убрать все ковры.

4.8.5 игрушки дезинфицируют один раз в конце дня, погружая в раствор дезинфекционных средств, эффективных в отношении вирусов;

4.8.6 одномоментно проводится смена постельного белья, далее по графику. Индивидуальные полотенца менять ежедневно до окончания карантина. Снять шторы, убрать мягкий набивной инвентарь во всех помещениях группы для последующей дезинфекции до окончания карантина.

4.8.7 сбор грязного белья осуществляют в закрытой таре (клеенчатые или полиэтиленовые мешки, специально оборудованные и маркированные бельевые тележки или другие аналогичные приспособления). Персонал должен работать с использованием средств индивидуальной защиты.

4.9 после проведения уборки, уборочный инвентарь погрузить в раствор дезинфицирующего средства. После экспозиции его прополаскать, высушить и хранить в сухом виде в специально выделенной для этого отдельной емкости, помещении.

4.10 поддержание оптимального температурного режима помещений, соблюдение графика проветривания не менее 4-х раз в день кабинетов, рекреаций, спальных помещений с использованием специализированных приборов для обеззараживания воздуха, разрешенных к применению в соответствии с инструкцией производителя;

5 Проводить в течение эпидемического сезона разъяснительную работу с детьми, родителями и персоналом о мерах профилактики ОРИ, гриппа, о необходимости вакцинации против гриппа, пневмонии, менингококковой инфекции.

6 Разместить в зонах ожидания, холлах, уголках здоровья, стендах, сайте образовательной организации памятки для населения по профилактике ОРИ, гриппа.